

Nieuwendijk 12, 2026

Op 13 juni werd het terrein (2,8 ha, het naar natuur omgezette deel is 2 ha) weer bezocht. Het verslag is van Rob Rossel (terreineigenaar) en Rolf Roos. Het was niet zinvol (en te tijdrovend) om binnen een jaar weer een vrij volledige inventarisatie te maken. We beschrijven het beeld in 2026 en memoreren enkele nieuwe soorten en bijzondere ontwikkelingen.

Uit verslag 2025

In de voormalige paardenwei ter hoogte van Nieuwendijk 12 wordt op verschillende manieren de natuur op weg geholpen.

Er was een voorjaarsbeeld met dominantie van reukgras en opkomende veldzuring; daarnaast veel kruipende boterbloem en weinig scherpe boterbloem wat wijst op relatief veel storing/voedsel in de bodem; verder zeer weinig glanshaver. In kleine aantallen wel diverse soorten van vochtig hooiland/moeras: kantig hertshooi, moerasrolklaver, koninginnekruid, kale jonker, brunel, biezeknoppen, rietorchis, heelblaadjes en in een eerder dichtgereden strook veel knikkende vossenstaart. Ook ruwe smele verscheen, een ruige soort die weinig op Goeree wordt gezien. Kamgras was ook een verrassende soort.

Lees de PDF 2025 voor de volledige inventarisatie.

<https://www.nlgo.nl/post/kopie-van-inventarisatie-flora-nieuwendijk-12>



Beeld en soorten 2026

Er zijn plagstroken en ongemaaid hooiland met dominantie van gestreepte witbol, reukgras en lokaal glanshaver. Doel voor het gebied is 'kruidenrijk vochtig grasland' maar we zien nu vooralsnog 'ruig grasland met verspreide moeraskruiden'. Rietorchis neemt bescheiden toe, net als kale jonker. Toename is te zien bij echt duizenguldenkruid (plagplek), echte koekoeksbloem en moerasrolklaver. In plagstroken is nog vrij weinig ontwikkeling, veel open bodem, weinig gras, lokaal wat zomprus ed en een voor Goeree (?) nieuwe soort: Noorse ganzerik.

Soorten van drogere graslanden zijn er ook: rode lijstsoorten steenanjer en beemdkroon die zich in 2026 vestigde (foto). Bijenorchis verscheen ook in 2026 met 4 exemplaren in zonnige bosrand en net ten noorden van het terrein langs de Stellingweg staat ook brede wespenorchis.

Beheer en belang

Het advies is om plagplekken goed te blijven volgen en grote delen (bv 65%) wellicht enkele jaren twee keer te maaien (een keer begin juni, tweede keer in najaar) om nutrienten uit het systeem te krijgen. Nabeweiding met schapen is ook sterk te overwegen. Uitgemaaide paden (eventueel breder?) bieden een extra biotoop en zouden aan waarde winnen als maaisel wordt afgevoerd.

Als rustgebied voor fauna (oa zomertortel) en leefgebied voor o.a. nachtvlinders zoals getekende rozenspanner (foto), de als vogelpoepje gecamoufleerde witte eenstaart, populierengouduil en seringenvlinder en vleermuizen zoals de gewone- en ruige dwergvleermuis, watervleermuis, de grootoor (foto) en de franjestaart van grote betekenis.



